

**Pilzgattungen Europas - Liste 2: Notizbuchartige Auswahlliste
zur Bestimmungsliteratur für cyphelloide Pilze**

Bernhard Oertel
INRES
Universität Bonn
Auf dem Hügel 6
D-53121 Bonn
E-mail: b.oertel@uni-bonn.de
24.06.2011

Gattungen

- Arrhenia* s. Agaricales-Datei
Auriculariopsis (im jungen Stadium cyphelloid) s.
Aphyllorphorales-Datei
Calathella Reid 1964 nom. illeg. [non Florin 1929; fossile Alge]
(zu *Flagelloscypha*):
Typus: *C. erucaeformis* (Mich. ex Batsch : Fr.) Reid [= *Peziza eruciformis* (*erucaeformis*) Mich. ex Batsch : Fr.]
Bestimm. d. Gatt.: Agerer (1983), Typusstudien ..., Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 184); Horak (2005), 34 u. 200; Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 41; Moser (1983), 33 u. 165; Singer-Schlüssel (1986), 394 u. 387 (bei *Flagelloscypha* mit ausgeschlüsselt)
Abb.: Boud 172; PFNO **14/15**, 453
Lit.: Agerer, R. (1973), *Persoonia* **7**, 389-436; (1983), Typusstudien an cyphelloiden Pilzen ..., Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 186 u. 184; Schlüssel)
Cooke, W.B. (1961), S. 72
Jones, E.B.G. et al. (2009), Classification of marine Ascomycota, anamorphic taxa and Basidiomycota, *Fungal Diversity* **35**, 1-187 (S. 15)
Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 244
Pilát (1933), BSMF **49**, 34-51
Reid, D.A. ("1963", p. 1964), Notes on some fungi ..., *Persoonia* **3**, 97, 118 u. 131
Singer (1986) (als Synonym von *Flagelloscypha*) s. ferner in 1)
Calyptella Quéél. 1886:
Typus: *C. capula* (Holmskj. : Fr.) Quéél. (= *Peziza capula* Holmskj. : Fr.)
Bestimm. d. Gatt.: Agerer (1983), Typusstudien ..., Mitt.

Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 185);
Benkert (1988), 85; Cooke, W.B. (1961), 13, 15 u. 30
(auch Arten-Schlüssel); Horak (2005), 34 u. 200 (auch
Arten-Schlüssel); Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga
Nordica*, 41 (auch Arten-Schlüssel); Moser (1983), 32
u. 151 (auch Arten-Schlüssel); Singer (1986), 393 u.
337

Abb.: Bresadola, *Omnia Bresadoliana*, Farb-Abb.; Cannon u.
Kirk (2007), 358; PFNO **10**, 217 u. 218; *Field Mycology*
8(3), 81, 2007; *Natura Mosana* **53**(3), 2000, S. 91;
Tintling **7**(4), 6, 2002; s. ferner in 2)

Lit.: Bollmann, Gminder u. Reil-CD (2007)

Burt (1914), *Ann. Missouri Bot. Gard.* **1**, 357-382

Cooke, W.B. (1989), *The cyphelloid fungi of Ohio*, *Mem. NY
Bot. Gard.* **49** [Rogerson-Festschrift], 158-172 (S. 160)

Donk (1931), S. 130

Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 264

Moser et al. (1985 ff.), *Farbatlas (Gatt.-beschr.)*

Pilat, A. (1924), *Beiträge zur Kenntnis der Thelephoraceen*,
1, *Die Cyphellaceen Böhmens*, *AM* **22**, 204-218; Pilat, A.
(1925), *Zweiter Beitrag zur Kenntnis ...*, *AM* **23**, 144-
173

Reid (1961), *Kew Bull.* **15**, 261-275

Sharma (1985), *Distribution ...*, *Res. Bull. Panjab Univ.*
36(1/2), 101-109 (auch europäische Arten)

Singer, R. ("1977", p. 1978), *Keys for the identification
of the species of the Agaricales*, **1**, *Sydowia* **30**, 192-
279 (Bestimm.-schl. S. 270)

s. ferner in 1)

Campanella Henn. 1895:

Typus: *C. buettneri* Henn.

Bestimm. d. Gatt.: Gröger (2007), 33 u. 187; Horak (2005),
32, 33, 39 u. 200 (auch Arten-Schlüssel); Knudsen u.
Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 41; Moser (1983),
30, 32 u. 46 (aber Arten nicht erwähnt); Singer-
Schlüssel (1986), 306; Smith in Ainsworth (1973), 427

Abb.: Hemmes u. Desjardin (2002), *Mushrooms of Hawaii*, 63;
Roux, 318; *BGMB* **45**(1), 58, 2002; *Bull. FAMM* **31**, 47,
2007; *BSMF* **123**(3/4), 266, 2007; *Plant Syst. Evol.* **170**,
134, Fig. 1a u. 1b; *Riv. Micol.* **52**(2), 130-131 u. 137,
2009; *Tintling* **14**(2), 86, 2009; s. ferner in 2)

Lit.: Bollmann, Gminder u. Reil-CD (2007)

Bon (1987), *Basidiomycetes ...*, *DM* **17**(87), 1-10

Donk (1959), 40

FAN 3

Gröger (2007), 187

Hennings (1895), *Bot. Jahrb. Syst.* **22**, 95

Horak (1968), 143

- Lanconelli (2002), *Campanella* ..., BGMB **45**(1), 57-61
- Ludwig (2000/01)
- Malençon, G. u. R. Bertault (1975), Flore des Champignons Supérieurs de Maroc, Bd. 2, Rabat, 419
- Moser et al. (1985 ff.), Farbatlas (Gatt.-beschr.)
- Noordeloos, M.E. (2008), *Campanella* Henn., in Knudsen u. Vesterholt, Funga Nordica, 287
- Parmasto (1981), On the Asian ..., NH **34**, 437-447
- Peric, B. ("2007", p. 2008), *Campanella inquilina* ..., BSMF **123**(3/4), 263-272
- Redhead, S.A. (1984), CJB **62**, 865-892
- Reid, D.A. (1995), Three unusual ..., Mycotaxon **53**, 337-342
- Romagnesi, H. (1980), Deux agarics ..., BSMF **96**, 423-428
- Singer (1945), *Lloydia* **8**, 170-230; Singer, R. (1950), *Lloydia* **13**, 249-259; Singer, R. ("1975", p. 1976), The neotropical ..., NH **26**, 847-896 (Schlüssel); Singer, R. ("1977", p. 1978), Keys for the identification of the species of the Agaricales, 1, *Sydowia* **30**, 192-279 (Schlüssel); Singer, R. u. A. Hausknecht (1990), Some interesting ..., Plant Syst. Evol. **170**, 133-150
- s. ferner in 1)
- Cellypha* Donk 1959:
- Typus: *C. goldbachii* (Weinm.) Donk (= *Cyphella goldbachii* Weinm.)
- Bestimm. d. Gatt.: Agerer (1983), Typusstudien ..., Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 185); Cooke, W.B. (1961), 13, 15 u. 51; Horak (2005), 34 u. 201; Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 41; Moser (1983), 33 u. 188; Singer-Schlüssel (1986), 394 u. 431
- Abb.: PFNO **7**, Nr. 43; BGMB **37**(3/4), 69, 1994
- Lit.: Burt (1914), Ann. Missouri Bot. Gard. **1**, 357-382
- Cooke, W.B. (1989), The cyphelloid fungi of Ohio, Mem. NY Bot. Gard. **49** [Rogerson-Festschrift], 158-172 (S. 161)
- Donk (1959), 84
- Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 274
- Pilat, A. (1924), Beiträge zur Kenntnis der Thelephoraceen, 1, Die Cyphellaceen Böhmens, AM **22**, 204-218; Pilat, A. (1925), Zweiter Beitrag zur Kenntnis ..., AM **23**, 144-173
- Redhead (1981), CJB **59**, 574-589
- Reid, D.A. (1955), TBMS **38**, 387-399 (*C. goldbachii* als *Cyphella lactea*); Reid, D.A. ("1963", p. 1964), Notes on some fungi ..., Persoonia **3**, 97, 118 u. 131
- Singer (1978), NH **29**, 41-42
- Cephaloscypha* Agerer 1975 (ein Segregate von *Flagelloscypha*):
- Typus: *C. morlichensis* (W.B. Cooke) Agerer [= *Flagelloscypha morlichensis* W.B. Cooke; heute: *C. mairei* (Pil.) Agerer]

- Bestimm. d. Gatt.: Agerer (1983), *Typusstudien ...*, Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 185); Horak (2005), 34 u. 201; Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 41 (bei *Flagelloscypha* mit ausgeschlüsselt); Moser (1983), 33 u. 164; Singer-Schlüssel (1986), 394 u. 387 (bei *Flagelloscypha* mit ausgeschlüsselt)
- Lit.: Agerer, R. ("1974", p. 1975), *Flagelloscypha ...*, *Sydowia* **27**, 131-265 (S. 193-197); (1983), *Typusstudien ...*, Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 303 u. 185; Schlüssel)
- Cooke, W.B. (1961), 63
- Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 245 (als *Flagelloscypha*)
- Legon u. Henrici (2005), 34
- Singer (1986) (als Synonym von *Flagelloscypha*)
- Ceriporia* (cyphelloide Stadien dieser Porlinge):
- Lit.: Agerer (1978), NH **30**, 295-342 [S. 331: *Ceriporia reticulata* (Hoffm. : Fr.) Domanski]
- Chromocyphella* de Toni & Levi 1888 [= *Cymbella* Pat. 1886 nom. illeg. (non Agardh 1830)]:
- Typus: *Cymbella crouanii* Pat. & Doassans in Pat. nom. illeg. [heute *Chromocyphella muscicola* (Fr. : Fr.) Donk]
- Bestimm. d. Gatt.: Cooke, W.B. (1961), S. 13, 129 u. 136; Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 40 u. 56; Horak (2005), 33 u. 351; Moser (1983), 32 u. 310; Singer-Schlüssel (1986), 680
- Abb.: *Coolia* **52**(2), 71, 2009; *Mycol. Bavar.* **8**, 26, 2005; *SZP* **80**(5), 182, 2002
- Lit.: Bourdot u. Galzin (1928) (als *Phaeocyphella*)
- Burt, E.A. (1926), *Ann. Missouri Bot. Gard.* **13**, 173-354 (S. 316-317)
- Donk (1931), 132-133 (als *Phaeocyphella*)
- Donk (1959), 92-97
- Ellis u. Ellis (1998), 12
- Moser (1983), 310 (nicht im Index!)
- Pilat (1925), AM **23**, 144-173 (als *Phaeocyphella*)
- Senn-Irlet, B. (2008), *Chromocyphella* De Toni & Levi, in Knudsen u. Vesterholt, *Funga Nordica*, 862
- Cyphella* Fr. 1822 : Fr. 1822 [Gattungsname für *Cyphella digitalis* (Alb. & Schw. : Fr.) Fr., z.T. zu *Aleurodiscus* gestellt, und dann würde *Cyphella* zum nom. rej.]/
- Cyphellaceae:
- Typus: *C. digitalis* (Alb. & Schw. : Fr.) Fr. (= *Peziza digitalis* Alb. & Schw. : Fr.)
- Bestimm. d. Gatt.: Benkert (1988), 84; Horak (2005), 34 u. 201; Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 41; Singer (1986), 393 u. 335

Abb.: Sonderheft Landschaftspflege und Naturschutz in
Thüringen [Pilze - Leben im Untergrund] **47**(4), 187,
2010; Svampe **49**, 47, 2004; Tintling **16**(3), 26, 2011;
s. ferner in 2)

Lit.: Agerer (1976), ZP **42A**, 39-44; Agerer, R. (1986),
Cyphellaceae .., in Borghi, E., La Famiglia delle
Tricholomataceae, Atti del Convegno Internazionale di
Micologia del 10-15 settembre 1984, Centro Studi per
la Flora Mediterranea **6**, Borgo Val di Taro, 9-27

Bataille (1911), BSMF **27**, 369-386 (S. 379)

Bollmann, Gminder u. Reil-CD (2007)

Bourdot u. Galzin (1928)

Donk (1951); (1959), 67

Haller (1951), SZP **29**, 17-20

Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 275

Pilat, A. (1953), Hymenomyces novi vel minus cogniti
Cechoslovakiae, II, Acta Mus. Nat. Prague **9B**(2), Bot.
1, 1-109 (S. 88-90)

s. ferner in 1)

Cyphellopsis s. *Merismodes*

Cyphellostereum Reid 1965 (Agaricales) (vgl. *Muscinuapta*):

Lebensweise: Lichenisiert

Typus: *C. pusiolum* (Berk. & Curt.) Reid [= *Stereum pusiolum*
Berk. & Curt.]

Bestimm. d. Gatt.: Bernicchia, A. u. S.P. Gorjon (2010),
Corticiaceae s.l., Fungi Europaei **12**, Ed. Candusso, 55

Abb.: s. unter *Muscinuapta*

Lit. (s.a. unter *Muscinuapta*): Bernicchia, A. u. S.P. Gorjon
(2010), Corticiaceae s.l., Fungi Europaei **12**, Ed.
Candusso, 250

Bertault, R. (1979), Une Stéréacée nouvelle pour l'Europe,
Cyphellostereum pusiolum (Berk. & Curt.) Reid 1965,
Rev. Mycol. **43**, 101-103

Lawrey, J.D. et al. (2009), High concentration of
basidiolichens in a single family ..., MR **113**, 1154-
1171 (Phylogenie von *C. pusiolum*)

Moreau, P.A. et al. (2008), *Cyphellostereum* ..., DM
33(135/136), 53-75

Oberwinkler (2001), 211

Reid (1965), 336-342 (Erstbeschreibung d. Gatt. u.
Schlüssel)

Episphaeria Donk in Sing. ex Donk 1962:

Typus: *E. fraxinicola* (Berk. & Br.) Donk (= *Cyphella*
fraxinicola Berk. & Br.)

Bestimm. d. Gatt.: Horak (2005), 33 u. 351; Knudsen u.
Vesterholt (2008), Funga Nordica, 40; Moser (1983), 32
u. 310; Singer-Schlüssel (1986), 680

Abb.: ZM **68**(2), 156, 2002

- Lit.: Burt, E.A. (1924), *Ann. Missouri Bot. Gard.* **11**, 1-36
 Cooke, W.B. (1961, S. 123)
 Dam u. Dam-Elings (1991), *Woldmaria crocea* en *Episphaeria* ... , *Coolia* **34**(1), 22-26
 Donk (1962), 336-337
 Moser (1983), 310
 Reid, D.A. (1964), *Kew Bull.* **17**(2), 267-308
 Senn-Irlet, B. (2008), *Episphaeria* Donk, in Knudsen u. Vesterholt, *Funga Nordica*, 868
 Siepe, K. u. F. Kasperek (2002), *ZM* **68**, 153
Flagelloscypha Donk in Sing. 1951 (vgl. *Calathella*, *Cephaloscypha*, *Nochascypha* u. *Seticyphella*):
 Typus: *F. minutissima* (Burt) Donk in Sing. (= *Cyphella minutissima* Burt)
 Bestimm. d. Gatt.: Agerer (1983), *Typusstudien* ... , *Mitt. Bot. Staatssamml. München* **19**, 163-334 (S. 185); Cooke, W.B. (1961), 13, 15 u. 59 (auch Arten-Schlüssel); Horak (2005), 34 u. 201 (auch Arten-Schlüssel); Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 41 (auch Arten-Schlüssel); Moser (1983), 32 u. 163 (auch Arten-Schlüssel); Singer-Schlüssel (1986), 394 u. 387 (zus. mit *Calathella*, *Cephaloscypha* u. *Nochascypha* ausgeschlüsselt)
 Lit.: Agerer, R. (1972), *Zwei cyphelloide* ... , *WP* **9**(1), 1-16; Agerer, R. ("1973/74", p. 1975), *Flagelloscypha* ... , *Sydowia* **27**, 131-265
 Agerer, R. (1975), *Flagelloscypha*, *Studien an cyphelloiden Basidiomyceten*, Diss. München (265 S.)
 Agerer, R. (1978), *Cyphelloide* ... , *NH* **30**, 295-342 (S. 307); Agerer, R. (1979), *Flagelloscypha* sect. *Lachnelloscypha* ... , *Persoonia* **10**(3), 337-346; Agerer, R. (1979), *A new combination* ... , *Mycotaxon* **9**, 464-468; Agerer, R. (1983), *Typusstudien* ... , *Mitt. Bot. Staatssamml. München* **19**, 163-334 (S. 246 u. 185; Schlüssel)
 Cooke, W.B. (1989), *The cyphelloid fungi of Ohio*, *Mem. NY Bot. Gard.* **49** [Rogerson-Festschrift], 158-172 (S. 162)
 Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 244
 Moser et al. (1985 ff.), *Farbatlas* (Gatt.-beschr.)
 Pilat, A. (1924), *Beiträge zur Kenntnis der Thelephoraceen*, 1, *Die Cyphellaceen Böhmens*, *AM* **22**, 204-218; Pilat, A. (1925), *Zweiter Beitrag zur Kenntnis* ... , *AM* **23**, 144-173
 Reid, D.A. ("1963", p. 1964), *Notes on some fungi* ... , *Persoonia* **3**, 97-154; (1965), *TBMS* **48**, 513-537
 Singer (1951), *Agaricales in Modern Taxonomy*, 312 s. ferner in 1)
Glabrocypbella W.B. Cooke 1961:

- Typus: *G. palmarum* (Berk. & Curt.) W.B. Cooke (= *Cyphella palmarum* Berk. & Curt.)
- Bestimm. d. Gatt.: Cooke, W.B. (1961), 13, 15 u. 45 (auch Arten-Schlüssel)
- Lit.: Barrasa, J.M. et al. (1998), *Glabrocyphella ...*, MR **102**, 1265-1268
- Cooke, W.B. (1961)
- Cooke, W.B. (1989), The cyphelloid fungi of Ohio, Mem. NY Bot. Gard. **49** [Rogerson-Festschrift], 158-172 (S. 162) s. ferner in 1)
- Gloiocephala* Masee 1892 [man dachte früher, dass diese Gattung zu *Marasmius* gestellt werden müsse, s. aber Thorn et al. ("2005", p. 2006), *Mycologia* **97**, 1144 u. Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 256; darin zu Physalacriaceae] (vgl. a. Lit. zu *Marasmius*):
- Typus: *G. epiphylla* Masee
- Bestimm. d. Gatt.: Benkert (1988), 85; Bresinsky u. Besl (2001), 185 (als *Marasmius*); Gröger (2007), 32, 35, 42, 306 u. 307 (als *Marasmius*); Horak (2005), 26, 33, 41 u. 202 (auch Arten-Schlüssel); Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 45; Moser (1983), 24, 32, 48 u. 162 (auch Arten-Schlüssel); Singer-Schlüssel (1986), 394 u. 375; Smith in Ainsworth (1973), 427
- Abb.: Antonin u. Noordeloos (2010), A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe, 418 (*cornelii*) u. 425 (*cerkesii*); Ludwig 1/47.5 (*cornelii*) u. 47.27 (*caricis*); SZP **86**(2), 59, 2008; *Svampe* **63**, 40, 2011; *Tintling* **14**(2), 12, 2009; s. ferner in 2) (als *Marasmius caricis* u. *cornelii*)
- Lit.: Antonin, V. u. M.E. Noordeloos (1993), A monograph of *Marasmius*, *Collybia* and related genera in Europe, Part 1, *Libri Bot.* **8**, Eching (als *Marasmius*)
- Antonin, V. u. M.E. Noordeloos (2010), A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe, 2. Aufl., IHW, Eching, 413 (Schlüssel)
- Bas, C. (1961), The genus *Gloiocephala ...*, *Persoonia* **2**, 77-89
- Boudier (1894), *BSMF* **10**, 59-67
- Bresinsky (1964), *ZP* **30**, 59-62
- Corner, E.J.H. (1992), The development ..., *Persoonia* **14**(4) [Maas-Geesteranus-Festschrift], 395-405
- Gröger (2007), 307 (als *Marasmius*)
- Ludwig (2000/2001) (als *Marasmius caricis* u. *cornelii*)
- Meusers, M. u. S. (1985), Schlüssel für weiße Arten der Gattungen *Mycena*, *Hemimycena*, *Delicatula* und *Gloiocephala*, *Mitt. APN* **3**(2a), 66-101
- Noordeloos (1981), *Persoonia* **11**, 373-376; Noordeloos

- (2008), *Gloiocephala* Masee, in Knudsen u. Vesterholt, *Funga Nordica*, 256
- Redhead (1981), *CJB* **59**, 574-589
- Richter, T. u. H.O. Baral (2008), *Coronellaria pulicaris*, *Mollisia luctuosa* und *Marasmius cornelii* ..., *Boletus* **31**(1), 45-63 (S. 60; *Gloiocephala menieri* ss. Corner 1934 als *Marasmius cornelii*)
- Singer (1952), Le genre *Gloiocephala* ..., *RM* **17**, 161-164
- Henningsomyces* Kuntze 1898 emend. Agerer 1973 [non *Henningsomyces* Sacc. 1905; ist *Dysrhynchis* (außereuropäische *Loculascomyceten*)] (= *Solenia* Pers. 1794 : Fr. 1822; non *Solena* Loureiro 1790):
- Typus (Lectotypus durch Donk, *Reinwardtia* **1**, 212, 1951): *H. candidus* (Pers. : Fr.) Kuntze (= *Solenia candida* Pers. : Fr.)
- Bestimm. d. Gatt.: Agerer (1983), Typusstudien ..., *Mitt. Bot. Staatssamml. München* **19**, 163-334 (S. 185); Benkert (1988), 84; Cooke, W.B. (1961), 13, 15, 16 u. 19-26 (als *Solenia*) (auch Arten-Schlüssel); Horak (2005), 33 u. 203 (auch Arten-Schlüssel); Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 41 (auch Arten-Schlüssel); Talbot (1973), *The Fungi* **4B**, 344; nicht in Singer (1986), da von ihm zu den *Aphylophorales* gezählt, nur erwähnt S. 394
- Abb.: BC 21/1019; PFNO **1-5**, Nr. 138; BGMB **37**(5/6), 118, 1994; BMBDS **171**, 37 u. 39, 2003; *Field Mycology* **8**(3), 82, 2007; ÖZP **14**, 277, 2005; *Svampe* **41**, 21, 2000
- Lit.: Agerer, R. (1973), *Rectipilus* ..., *Persoonia* **7**, 389-436 und Diplomarbeit, Tübingen: *Rectipilus*, eine neue Gattung cyphelloider Pilze (75 S.); (1978), *NH* **30**, 295-342 (S. 315)
- Burt (1924), *Ann. Missouri Bot. Gard.* **11**, 1-36
- Cooke, W.B. (1989), *The cyphelloid fungi of Ohio*, *Mem. NY Bot. Gard.* **49** [Rogerson-Festschrift], 158-172 (S. 163)
- Donk (1931), 129-130; (1951), *Reinwardtia* **1**, 212
- Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 281
- Pilat, A. (1924), Beiträge zur Kenntnis der Thelephoraceen, 1, *Die Cyphellaceen Böhmens*, *AM* **22**, 204-218; Pilat, A. (1925), Zweiter Beitrag zur Kenntnis ..., *AM* **23**, 144-173; Pilat, A. (1933), *BSMF* **49**, 34-51
- Rauschert, S. (1987), *Fedd. Rep.* **98**, 657-664
- Reid, D.A. ("1963", p. 1964), *Notes on some fungi* ..., *Persoonia* **3**, 97, 118 u. 131
- Lachnella* (Fr.) Fr. 1836 (= *Cyphellolocalathus*) (vgl. *Nochascypha*):
- Typus: *L. alboviolascens* (Alb. & Schw. : Fr.) Fr. (= *Peziza alboviolascens* Alb. & Schw. : Fr.; mutmaßliche Anamorfe od. parasitischer Pilz?): *Geotrichum*

cyphellae Arnaud)

Anamorfen-Formgattung: *Periola*

- Bestimm. d. Gatt.: Agerer (1983), Typusstudien ..., Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 185); Cooke, W.B. (1961), **13**, 15 u. 65 (auch Arten-Schlüssel); Horak (2005), 34 u. 203 (auch Arten-Schlüssel); Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 41 (auch Arten-Schlüssel); Moser (1983), 32 u. 163 (auch Arten-Schlüssel); Singer-Schlüssel (1986), 393 u. 386
- Abb.: Keil, Abb. 415; PFNO **10**, 219 u. 220; Sonderheft Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen [Pilze - Leben im Untergrund] **47**(4), 207, 2010; Riv. Micol. **45**(3), 252-253, 2002; Tintling **7**(1), 10-11, 2002; **7**(4), 6, 2002; **10**(1), 55, 2002; **13**(4), 21, 2008
- Lit.: Agerer, R. (1978), NH **30**, 295-342 (S. 313); (1983), Typusstudien ..., Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 212 u. 185; Schlüssel)
- Burt (1914), Ann. Missouri Bot. Gard. **1**, 357-382; (1926), *ibid.* **13**, 173-354 (S. 315)
- Cooke, W.B. (1989), The cyphelloid fungi of Ohio, Mem. NY Bot. Gard. **49** [Rogerson-Festschrift], 158-172 (S. 164)
- Cunningham (1963), 313-314
- Donk (1931), 129; (1959), 97-106
- Kendrick u. Watling (1979), in Kendrick, The Whole Fungus **2**, Nat. Mus. Nat. Sci., Ottawa, S. 514 (Anamorfe *Geotrichum*?)
- Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 247
- Lammers, H. (1990), *Coolia* **33**, 103-106
- Moser et al. (1985 ff.), Farbatlas (Gatt.-beschr.)
- Pilat, A. (1924), Beiträge zur Kenntnis der Thelephoraceen, **1**, Die Cyphellaceen Böhmens, AM **22**, 204-218; Pilat, A. (1925), Zweiter Beitrag zur Kenntnis ..., AM **23**, 144-173; Pilat, A. (1929), *Mykologia* (Prag) **6**, 56-59
- Singer, R. (1976), *Marasmieae*, *Flora Neotropica* **17**, 58 (Schlüssel)
- s. ferner in 1)

Leptoglossum s. *Arrhenia*

Limnoperdon Escobar in Escobar et al. 1976 (in jungen Stadien wie ein cyphelloider Gasteromycet wirkend):

Typus: *L. incarnatum* Escobar

Lit.: Escobar, G.A. et al. (1976), *Limnoperdon* ...,

Mycologia **68**, 874-880; Escobar, G.A. u. D.E. McCabe

(1979), *Limnoperdon* ..., *Mycotaxon* **9**, 48-50

Kreisel, H. (2001), Checklist of the gasteral and secotioid Basidiomycetes of Europe, Africa, and the Middle Est, *ÖZP* **10**, 213-313 (S. 283 u. 297)

Voglmayr (1994), *Limnoperdon* ..., *ÖZP* **3**, 71-76

s. ferner in 1)

Maireina s. *Merismodes*

Merismodes Earle 1909 (= *Cyphellopsis*; = *Maireina*; = *Phaeocyphellopsis*):

Typus: *M. fasciculata* (Schw.) Earle {= *Cantharellus fasciculatus* Schw. [non *Solenia fasciculata* Pers. : Fr.; ist *Rectipilus fasciculatus* (Pers. : Fr.) Agerer]; muss *M. confusa* (Bres.) Reid als Synonym hinzugenommen werden?}

Nomenklatur und Synonymie von *Merismodes anomala*:

Merismodes anomala (Pers. : Fr.) Sing. [= *Peziza anomala* Pers. : Fr.; = *Cyphellopsis anomala* (Pers. : Fr.) Donk; = *Peziza rugosa* Sow.]

Nomenklatur und Synonymie von *Merismodes granulosa*:

Merismodes granulosa (Fuckel) Knudsen [= *Solenia granulosa* Fuckel; = *Merismodes bresadolae* (Grel.) Sing.; = *Cyphella gregaria* Syd. & P. Syd.; = *Cyphella leochroma* Bres.; = *Maireina monacha* (Speg.) W.B. Cooke; = *Cyphellopsis monacha* (Speg.) Reid; = *Cyphella tephroleuca* Bres.]

Bestimm. d. Gatt.: Benkert (1988), 84; Cooke, W.B. (1961), 13, 15, 83, 96, 101 (auch als *Cyphellopsis* u. *Maireina*), 113 u. 119 (*Phaeocyphellopsis*) (auch Arten-Schlüssel); Horak (2005), 33 u. 352 (auch Arten-Schlüssel); Knudsen u. Vesterholt (2008), *Funga Nordica*, 41 (auch Arten-Schlüssel); Moser (1983), 32 u. 311 (auch Arten-Schlüssel); nicht in Singer (1986), da von ihm zu den Aphyllophorales gezählt (erwähnt S. 394, 680 u. 848)

Abb.: Bresadola, *Fungi Tridentini* 269 und 210 (Abb. 166/2); PFNO **14/15**, 456; BGMB **37**(5/6), 119, 1994; *Tintling* **2**(3), 19, 1997; **7**(4), 8, 2002; **15**(6), 24, 2010; s. ferner in 2)

Lit.: Agerer (1978), NH **30**, 295-342 [S. 300 (*Cyphellopsis*) u. 318 (*Maireina*)]; Agerer et al. (1980), *Studien ...*, ZM **46**, 177-207

Bertault (1983), *Les Cyphellés*, DM **13**(52), 1-10

Bodensteiner, P. (2007), *Maireina ...*, *Mycol. Progr.* **6**(4), 221-228

Bollmann, Gminder u. Reil-CD (2007)

Burt (1914), *Ann. Missouri Bot. Gard.* **1**, 357-382; (1924), *ibid.* **11**, 1-36; (1926), *ibid.* **13**, 173-354 (S. 315-316)

Cooke, W.B. (1961)

Cooke, W.B. (1976), *On Cyphellopsis anomala ...*, *Mem. New York Bot. Gard.* **28** [Lowe-Festschrift], 32-37; Cooke, W.B. (1989), *The cyphelloid fungi of Ohio*, *Mem. NY Bot. Gard.* **49** [Rogerson-Festschrift], 158-172 [S. 160 u. 165 (*Phaeocyphellopsis*)]

Donk (1931), 128-129; (1962), 345-348 (*Cyphellopsis*)

Hausknecht (1994), Trattazione ..., BGMB **37**(5/6), 115-125
Heller u. Keizer (2004), ZM **70**, 18 (*Maireina monacha*)
Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 248
Moser et al. (1985 ff.), Farbatlas (Gatt.-beschr.)
Pilat, A. (1924), Beiträge zur Kenntnis der Thelephoraceen,
1, Die Cyphellaceen Böhmens, AM **22**, 204-218; Pilat, A.
(1925), Zweiter Beitrag zur Kenntnis ..., AM **23**, 144-
173; Pilat, A. (1933), BSMF **49**, 34-51
Reid, D.A. (1961), Kew Bull. **15**, 261-275; Reid, D.A.
("1963", p. 1964), Notes on some fungi ..., Persoonia
3, 97-154
Ryckegem u. Dam (1999), AMK 1999(1), 11-14 (*Maireina
monacha*)
Singer (1951), 345; NICHT in Singer (1986), nur erwähnt S.
394, 680 u. 848

Mniopetalum s. *Rimbachia*

Muscinupta Redhead, Lücking & Lawrey 2009 (Hymenochaetales)

(vgl. *Cyphellostereum* u. *Pseudolasiobolus*):

Lebensweise: Moosparasitisch

Typus: *M. laevis* (Fr. : Fr.) Redhead, Lücking & Lawrey [= *Cantharellus laevis* Fr. : Fr.; = *Cyphellostereum laevis* (Fr. : Fr.) Reid]

Bestimm. d. Gatt. (meist als *Cyphellostereum*): Benkert
(1988), 84; Bernicchia, A. u. S.P. Gorjon (2010),
Corticaceae s.l., Fungi Europaei **12**, Ed. Candusso, 54
(*Muscinupta*); Gröger (2007), 32 u. 238; Horak (2005),
34 u. 201; Hjortstam et al. (1987), 57; Jülich (1984),
29 u. 140; Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga
Nordica, 41; Moser (1983), 33 u. 128; Singer-Schlüssel
(1986), 393 u. 231 (zus. mit *Pseudolasiobolus*
ausgeschlüsselt)

Abb. (als *Cyphellostereum*): BGMB **37**(5/6), 116, 1994; BKPM
1, 111, 1984; s. ferner in 2)

Lit.: Antonissen, I. et al. (1990), De mycoflora van het
Zoerselbos, *Sterbeekia* **15**, 5-52 (S. 32 u. 35) (als
Cyphellostereum)

Bernicchia, A. u. S.P. Gorjon (2010), Corticaceae s.l.,
Fungi Europaei **12**, Ed. Candusso, 442

BFF 6 (als *Cyphellostereum*)

Bollmann, Gminder u. Reil-CD (2007) (als *Cyphellostereum*)

Breitenbach, J. u. F. Kränzlin (1984), *Cyphellostereum* ...,
BKPM **1**, 103-107 (als *Cyphellostereum*)

CNE 3 (S. 318-321) (als *Cyphellostereum*)

Cooke, W.B. (1961), S. 131 (als *Cyphellostereum*)

Corner (1966) (als *Leptoglossum*)

Cunningham (1963), 317 (als *Lachnella*)

Donk (1931), S. 132 (*M. laevis* als *Cyphella muscigena* ss.
Burt)

- Ellis u. Ellis (1998), 12 (als *Cyphellostereum*)
 FAN 3, 63 (als *Cyphellostereum*)
 Gröger (2007), 238 (als *Cyphellostereum*)
 Hausknecht (1994), Trattazione ..., BGMB **37**(5/6), 115-125
 (als *Cyphellostereum*)
 Hoiland, K. (1976), The genera ..., Norweg. J. Bot. **23**,
 201-212 (als *Cyphellostereum*)
 Keizer (1994), Taxonomical notes ..., Persoonia **15**, 489-524
 (als *Cyphellostereum*)
 Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 68 (als
Cyphellostereum)
 Lawrey, J.D. et al. (2009), High concentration of
 basidiolichens in a single family ..., MR **113**, 1154-
 1171 (S. 1167 *Muscinupta* gen. nov.)
 Moser et al. (1985 ff.), Farbatlas (Gatt.-beschr.) (als
Cyphellostereum)
 Pilat, A. (1924), Beiträge zur Kenntnis der Thelephoraceen,
 1, Die Cyphellaceen Böhmens, AM **22**, 204-218; Pilat, A.
 (1951), Studia Bot. Cechoslov. **12**, 1-72 (S. 65) (als
Cyphellostereum)
 Redhead (1984), *Arrhenia* ..., CJB **62**, 865-892; Redhead et
 al. (2002), Phylogeny ..., Mycotaxon **82**, 151-168 (als
Cyphellostereum)
 Reid, D.A. ("1963", 1964), Notes on some fungi ...,
 Persoonia **3**, 97-154 (S. 144; als *Stereum boreale*)
 Reid (1965), 336-342 (Schlüssel) (als *Cyphellostereum*)
 s. ferner in 1) (als *Cyphellostereum*)
Mycaureola Maire & Chemin 1922 emend. Porter & Farnham 1986:
 Lebensweise: Algenparasitisch an der Meeresalge *Dilsea*
carnosa [Nachweis: Großbritannien etc.]
 Phylogenie: Mit *Gloiocephala* verwandt
 Typus: *M. dilseae* Maire & Chemin emend. Porter & Farnham
 Bestimm. d. Gatt.: Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga
 Nordica, 40
 Lit.: Binder, M. et al. (2006), Evolutionary relationships
 ..., Amer. J. Bot. **93**, 547-556
 Jones, E.B.G. et al. (2009), Classification of marine
 Ascomycota, anamorphic taxa and Basidiomycota, Fungal
 Diversity **35**, 1-187 (S. 16)
 Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 257
 Maire u. Chemin (1922), Comptes Rendus **175**, 319 (jedoch als
 Pyrenomycet beschrieben)
 Porter, D. u. W.F. Farnham (1986), *Mycaureola* ..., TBMS **87**,
 575-582
Nochascypha Agerer 1983 (vgl. *Flagelloscypha* u. *Lachnella*):
 Typus: *N. filicina* (Karst.) Agerer (= *Cyphella filicina*
 Karst. [non *Solenia filicina* Peck nom. illeg.; ist
Woldmaria crocea (Karst.) W.B. Cooke]; Synonym:

Flagelloscypha filicina (Karst.) Donk}

Bestimm. d. Gatt.: Agerer, R. (1983), Typusstudien ..., Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 185); Horak (2005), 203 (mit bei *Lachnella*); Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 41 (bei *Flagelloscypha* mit ausgeschlüsselt); Moser (1983), 32 u. 163 (als *Lachnella*); Singer-Schlüssel (1986), 394 u. 387 (zus. mit *Flagelloscypha* ausgeschlüsselt)
Lit.: Agerer, R. (1983), Typusstudien ..., Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 262 u. 185; Schlüssel)

Bodensteiner, P. u. R. Agerer (2003), *Nochascypha* ..., Mycol. Progr. **2**(4), 297-304 (Schlüssel)

Cooke, W.B. (1961, S. 63 u. 76)

Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 245 (als *Flagelloscypha*)

Singer (1986) (als Synonym von *Flagelloscypha*)

Pellidiscus Donk 1959 (= *Phaeoglabrotricha*):

Typus: *P. pallidus* (Berk. & Br.) Donk (= *Cyphella pallida* Berk. & Br.)

Bestimm. d. Gatt.: Cooke, W.B. (1961), 13 u. 113, 114 u. 115 (auch als *Phaeoglabrotricha*); Horak (2005), 33 u. 351; Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 40; Moser (1983), 32 u. 310; Singer-Schlüssel (1986), 680
Abb.: Tintling **15**(6), 24, 2010; s. ferner in 2)

Lit.: Agerer, R. (1978), Cyphelloide Pilze ..., NH **30**, 295-342 (S. 324)

Bertault (1983), Les Cyphellés, DM **13**(52), 1-10

Bodensteiner et al. (2004), Phylogenetic ..., Molec. Phylog. Evol. **33**, 501-515

Bollmann, Gminder u. Reil-CD (2007)

Cooke, W.B. (1961, S. 71 u. 114)

Donk (1959), 89-92

Hjortstam, K. (1986), Contribution to the knowledge of *Pellidiscus pallidus*, Windahlia **15**, 59-61

Jülich (1972), Monographie der Atheliae (Corticaceae, Basidiomycetes), Willdenowia Beih. **7** (als *Cyphellathelia*)

Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 907

Moser (1983), 310

Moser et al. (1985 ff.), Farbatlas (Gatt.-beschr.)

Reid, D.A. ("1963", p. 1964), Notes on some fungi ..., Persoonia **3**, 97-154

Senn-Irlet, B. (1991), *Crepidotus, Pellidiscus* ..., Nordic J. Bot. **11**, 587-597; Senn-Irlet, B. (2008), *Pellidiscus* Donk, in Knudsen u. Vesterholt, Funga Nordica, 907

Phaeoglabrotricha s. *Pellidiscus*

Phaeosolenia Speg. 1902:

Typus: *P. platensis* Speg. [heute: *Phaeosolenia densa* (Berk.) W.B. Cooke]

Bestimm. d. Gatt.: Cooke, W.B. (1961), 13, 113 u. 122 (auch Arten-Schlüssel); Horak (2005), 33 u. 351 (auch Arten-Schlüssel); Moser (1983), 32 (Arten nicht erwähnt); Singer-Schlüssel (1986), 680

Abb.: BSMF **121**(2), 136, 2005; *Coolia* **51**(3), 126, 2008; *Tintling* **7**(4), 7, 2002; ZM **68**(2), 155, 2002

Lit.: Burt, E.A. (1924), *Ann. Missouri Bot. Gard.* **11**, 1-36 (als *Solenia*)

Cooke, W.B. (1961)

Cooke, W.B. (1989), *The cyphelloid fungi of Ohio*, *Mem. NY Bot. Gard.* **49** [Rogerson-Festschrift], 158-172 (S. 166)

Cunningham (1963), 319-320

Donk (1962), 344-345

Reid (1963/64), *Kew Bull.* **17**, 267-308

Siepe, K. u. F. Kasperek (2002), *Phaeosolenia densa*, ein für Deutschland neuer cyphelloider Basidiomycet, ZM **68**, 153-164

Singer (1966), *Darwiniana* **14**, 8-18 (Bestimm.-schl.)

Spegazzini (1902), *Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires*, Ser. 3, **1**, 53

Porotheleum s. *Stromatoscypha* s. Aphyllophorales-Datei

Pseudolasiobolus Agerer 1983 (vgl. *Muscinupta*):

Typus: *P. minutissimus* Agerer

Bestimm. d. Gatt.: Agerer (1983), *Typusstudien ...*, *Mitt. Bot. Staatssamml. München* **19**, 163-334 (S. 184); Singer-Schlüssel (1986), 393 u. 231 (zus. mit *Cyphellostereum* ausgeschlüsselt)

Lit.: Agerer, R. (1983), *Typusstudien ...*, *Mitt. Bot. Staatssamml. München* **19**, 163-334 (S. 279 u. 184; Schlüssel)

Legon u. Henrici (2005), 246

Singer (1986), 287 (als *Cyphellostereum*)

Rectipilus Agerer 1973:

Typus: *R. fasciculatus* (Pers. : Fr.) Agerer [= *Solenia fasciculata* Pers. : Fr.; non *Cantharellus fasciculatus* Schw.; ist *Merismodes fasciculata* (Schw.) Earle]

Bestimm. d. Gatt.: Agerer (1983), *Typusstudien ...*, *Mitt. Bot. Staatssamml. München* **19**, 163-334 (S. 185); Benkert (1988), 84; Horak (2005), 33 u. 204 (auch Arten-Schlüssel); nicht in Singer (1986), da von ihm zu den Aphyllophorales gezählt (erwähnt S. 394 u. 852)

Abb.: BMBDS **171**, 37 u. 39, 2003

Lit.: Agerer (1972), *WP* **9**, 1-9; Agerer (1973), *Rectipilus ...*, *Persoonia* **7**, 389-436 (u.a. S. 413) und Agerer, *Diplomarbeit*, Tübingen: *Rectipilus*, eine neue Gattung

cyphelloider Pilze (75 S.)

Burt (1924), Ann. Missouri Bot. Gard. **11**, 1-36

Cooke, W.B. (1961, S. 23)

Cooke, W.B. (1989), The cyphelloid fungi of Ohio, Mem. NY Bot. Gard. **49** [Rogerson-Festschrift], 158-172 (S. 167)

Cunningham (1963), 308-309 (als *Lachnella*)

Legon u. Henrici (2005), 251

Wei, Y.L. u. Y.C. Dai (2004), *Rectipilus* ..., Mycosystema **23**, 437-438

s. ferner in 1)

Rimbachia Pat. in Pat. & Lagerh. 1891 (= *Mniopetalum*; = *Skepperiella*):

Lebensweise: Moosparasitisch

Typus: *R. paradoxa* Pat.

Bestimm. d. Gatt.: Benkert (1988), 84; Bresinsky u. Besl (2003), 39-43, 83-84 u. 206; Horak (2005), 34 u. 204 (auch Arten-Schlüssel); Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 41 (auch Arten-Schlüssel); Moser (1983), 33 u. 151 (als *Mniopetalum*) (auch Arten-Schlüssel); Singer-Schlüssel (1986), 392, 393 (*Mniopetalum*, *Pleuromyconula*), 334, 333 (*Skepperiella*), 370 u. 432 (*Pleuromyconula*)

Abb.: BGMB **37**(5/6), 122; PFNO **7**, 48; *Coolia* **52**(4), 181-185, 2009; Riv. Micol. **42**(4), 311, 1999; SZP **80**(3), 102, 2002; Svampe **58**, 15, 2008; Tintling **7**(4), 9, 2002; **12**(1), 65, 2007; s. ferner in 2)

Lit.: BFF 6

Bollmann, Gminder u. Reil-CD (2007)

Corner (1966), 143 u. 172

Donk (1931), 131-132; (1959), 44 (*Skepperiella*); (1962), 332-336

FAN 3

Gröger (2007), 33 u. 180 (*R. bryophila*)

Hausknecht (1994), Trattazione ..., BGMB **37**(5/6), 115-125

Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 239

Kühner u. Romagnesi (1954), Espèces nouvelles ..., Bull. Soc. Nat. d'Oyonnax **8**, 73-131 (S. 77) [Reprint: Compléments à la Flore Analytique, S. 113]

Moser et al. (1985 ff.), Farbatlas (Gatt.-beschr.) (auch als als *Mniopetalum*)

Patouillard u. Lagerheim (1891), Champignons ..., BSMF **7**, 158-184 (S. 159)

Pegler (1973), Kew Bull. **28**, 257

Pilat (1927), BSMF **43**, 56 [als *Skepperiella*]

Redhead, S.A. (1984), *Arrhenia* and *Rimbachia* ..., CJB **62**, 865-892 (Schlüssel); Redhead, Lutzoni, Moncalvo u.

Vilgalys (2002), Phylogeny ..., Mycotaxon **83**, 19-57

Senn-Irlet, B. u. P.A. Moreau (2003), Notes on some

- Rimbachia* species from the Alps, CM **54**, 145-154
- Singer, R. (1963), "*Skepperiella populi*" y la filogenia de las "Cyphellaceae", Bol. Soc. Argent. Bot. **10**, 209-214 (Schlüssel); Singer, R. (1966), Notes ..., Darwiniana **14**(1), 9-18; Singer, R. (1976), Marasmieae, Flora Neotropica **17** (347 S.)
- Zang (1986), New or interesting ... Himalayas, Mycotaxon **26**, 299-308
- Seticyphella* Agerer 1983 (vgl. *Flagelloscypha*):
- Typus: *S. tenuispora* Agerer
- Weitere Art: *S. niveola* (Sacc.) Agerer [= *Flagelloscypha niveola* (Sacc.) Knudsen]
- Bestimm. d. Gatt.: Agerer (1983), Typusstudien ..., Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 184); Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 41 (bei *Flagelloscypha* mit ausgeschlüsselt)
- Abb.: Schmid-Heckel (1990), 90, Abb. 10; Coolia **54**(2), 93-98, 2011; Svampe **52**, 28, 2005
- Lit.: Agerer, R. (1983), Typusstudien ..., Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334 (S. 282 u. 184; Schlüssel)
- Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 245 (*S. niveola* als *Flagelloscypha*)
- Læssøe, T. (2005), Stivharet Hængeskal (*Seticyphella niveola*) ..., Svampe **52**, 28-29
- Legon u. Henrici (2005), 270
- Solenia* s. *Henningsomyces*
- Stereopsis* s. Aphyllorphorales-Datei
- Stigmatolemma* Kalchbr. 1882 (= *Rhodocyphella*) (zu *Resupinatus*?):
- Typus: *S. incanum* Kalchbr.
- Bestimm. d. Gatt.: Cooke, W.B. (1957), The Porotheleaceae, *Porotheleum*, Mycologia **49**, 680-693 (auch Arten-Schlüssel); Cooke, W.B. (1961), 13, 15, 105 u. 128 (auch als *Rhodocyphella*) (auch Arten-Schlüssel); Horak (2005), 33 u. 204 (auch Arten-Schlüssel); Jülich (1981), 279 (auch Arten-Schlüssel); Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 41 (als *Resupinatus*; auch Arten-Schlüssel); Moser (1983), 32 u. 154 (auch Arten-Schlüssel); Singer-Schlüssel (1986), 392 u. 344
- Abb.: PFNO **6**, 11; PFNO **10**, 234; Field Mycology **8**(3), 80, 2007; Tintling **15**(1), 74, 2010; s. ferner in 2)
- Lit.: Agerer (1978), NH **30**, 295-342 (S. 326); (1978), ZM **44**, 51-70
- Bernicchia, A. (2005), Polyporaceae s.l., Fungi Europaei **10**, Ed. Candusso, Alassio, 522 (*S. poriaeforme*)
- Bollmann, Gminder u. Reil-CD (2007)
- Bourdot u. Galzin (1928), 162-164
- Cooke, W.B. (1957), The Porotheleaceae ..., Mycologia **49**,

680-693; Cooke, W.B. (1989), The cyphelloid fungi of Ohio, Mem. NY Bot. Gard. **49** [Rogerson-Festschrift], 158-172 (S. 168) (auch als *Rhodocyphella*)

Donk (1962), 337-344

Elborne in Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 41 (als *Resupinatus*)

Kalchbrenner (1882), Grevillea **10**, 104

Ryvarden u. Gilbertson (1994), European Polypores **2**, Synopsis fungorum **7**, Oslo, 647 (*S. poriaeforme*)

Thorn, R.G. et al. ("2005", p. 2006), A new poroid species of *Resupinatus* from Puerto Rico, with a reassessment of the cyphelloid genus *Stigmatolemma*, Mycologia **97**, 1140-1151

Stromatoscypha s. Aphyllophorales-Datei

Woldmaria W.B. Cooke 1961:

Typus: *W. crocea* (Karst.) W.B. Cooke [= *Solenia crocea* Karst.; Synonyma: *W. filicina* (Peck) Knudsen in Knudsen & Hansen nom. illeg.; *Solenia filicina* Peck nom. illeg. (non *Cyphella filicina* Karst.; ist *Nochascypha filicina*)]

Bestimm. d. Gatt.: Cooke, W.B. (1961), 13, 15 u. 29; Horak (2005), 34 u. 205; Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 41; Talbot (1973), The Fungi **4B**, 344; nicht in Singer (1986), da von ihm zu den Aphyllophorales gezählt

Abb.: Poelt u. Jahn 31; s. ferner in 2)

Lit.: Agerer (1983), Typusstudien ..., Mitt. Bot. Staatssamml. München **19**, 163-334

Bodensteiner, P. et al. (2004), Phylogenetic ..., Molec. Phylog. Evol. **33**, 501-515

Bollmann, Gminder u. Reil-CD (2007)

Cooke, W.B. (1961), 29

Dam u. Dam-Elings (1991), *Woldmaria crocea* ..., Coolia **34**(1), 22-26

Donk (1962)

Forstinger et al. (1990), Bemerkenswerte ..., Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde **130**, 739-751

Knudsen u. Hansen (1996), Nomenclatural ..., Nordic J. Bot. **16**, 211-221

Knudsen u. Vesterholt (2008), Funga Nordica, 249 (als *W. filicina*)

Moser et al. (1985 ff.), Farbatlas (Gatt.-beschr.)

Sivertsen (1963), Blyttia **21**(3), 123-124

Woldmar, A.S. (1954), *Solenia crocea* ..., Friesia **5**, 96-98; (1956), Några ..., ibid. **5**(3-5), 425-432

Allgemeine Literatur u. Datenbasen

- 1) Kirk, P.M., P.F. Cannon, D.W. Minter u. J.A. Stalpers (2008), Dictionary of the Fungi, 10th edition, CABI, Wallingford, Oxon (771 S.)
 - 2) Bollmann, A., A. Gminder u. P. Reil (2007), Abbildungsverzeichnis europäischer Großpilze, 4. Aufl., Jahrbuch Schwarzwälder Pilzlehorschau Band **2** (301 S. und Indices)
- Ainsworth, G.C. et al. (1973), The Fungi, an Advanced Treatise, Bd. **4B**, Basidiomycetes and Lower Fungi (540 S.)
- Benkert, D. (1988), in: Michael, E., B. Hennig u. H. Kreisel, Handbuch für Pilzfreunde **6**, 2. Aufl., G. Fischer, Jena
- BFF 6: Watling, R. u. N.M. Gregory, British Fungus Flora **6**, Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotoid agarics, Edinburgh 1989
- Bibliography of Systematic Mycology [Internet-Version; Hrsg.: CABI Bioscience]:
URL: <http://www.indexfungorum.org/BSM/bsm.asp>
- Bourdot, H. u. A. Galzin (Reprint 1984 des Originals aus dem Jahre "1927", p. 1928), Hyménomycètes de France
- Breitenbach, J. u. F. Kränzlin (1984), Pilze der Schweiz, Band **2**, Luzern
- Burt, E.A. (1914), Ann. Missouri Bot. Gard. **1**, 185-228 u. 357-382; Burt, E.A. (1924), *ibid.* **11**, 1-36; Burt, E.A. (1926), *ibid.* **13**, 173-354 (Auszug S. 315-354)
- Checklist of the British ... s. Legon u. Henrici (2005)
- CNE 3: Eriksson, J. et al., Corticiaceae of North Europe **3** (1975), Fungiflora, Oslo
- CNE 7: Eriksson, J. et al., Corticiaceae of North Europe **7** (1984), Fungiflora, Oslo
- Compléments à la Flore Analytique s. Kühner u. Romagnesi (1977)
- Cooke, W.B. (1953), The Genera of Homobasidiomycetes, exclusive of the Gasteromycetes, Beltsville
- Cooke, W.B. (1957), The Porotheleaceae, *Porotheleum*, Mycologia **49**, 680-693
- Cooke, W.B. (1961), The Cyphellaceous fungi, Beih. Sydowia **4**, Horn (wurde von Donk scharf kritisiert)
- Corner, E.J.H. (1966), A Monograph of Cantharelloid Fungi, Ann. Bot. Mem. **2**
- Cunningham, G.H. (1963), The Thelephoraceae of Australia and New Zealand, DSIR Bull. **145**, Wellington (359 S.)
- Donk, M.A. (Neudruck der Ausgabe von 1931/1933), Revisie van de Nederlandse Heterobasidiomycetae en Homobasidiomycetae-Aphyllaphoraceae, Teil 1, 68-200 [in Med. Ned. Mycol. Ver. **18/20?**]; Revision der niederländischen Homobasidiomycetae-Aphyllaphoraceae, Teil 2, Mededeel. Bot. Mus. Herbarium

- Rijksuniv. Utrecht **9**, 1-278; Neudruck beider Teile: *Bibl. Mycol.* **21**, Cramer, Lehre 1969
- Donk, M.A. (1951), The generic names proposed for Hymenomyces, I, "Cyphellaceae", *Reinwardtia* **1**(2), 199-220
- Donk, M.A. (1959/ 1962), Notes on 'Cyphellaceae' I, *Persoonia* **1**(1), 25-110; ... II, *ibid.* **2**(3), 331-348
- Donk, M.A. (1966), A reassessment of the Cyphellaceae, *Acta Bot. Neerl.* **15**, 95-101
- Ellis, M.B. u. J.P. Ellis (1998), *Microfungi on miscellaneous substrates*, 2. Aufl., Slough
- FAN 3: Bas, C. et al., *Flora Agaricina Neerlandica* **3**, Tricholomataceae (2), Rotterdam 1995
- Gams, W. (1984), An index to fungal names and epithets sanctioned by Persoon and Fries, *Mycotaxon* **19**, 219-270
- Hansen, L. u. H. Knudsen (Hrsg.) (1992), *Nordic Macromycetes* **2**, Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales, Nordsvamp, Kopenhagen (474 S.)
- Hansen, L. u. H. Knudsen (Hrsg.) (1997), *Nordic Macromycetes* **3**, Heterobasidioid, aphyllorphoroid and gastromycetoid Basidiomycetes, Nordsvamp, Kopenhagen (445 S.)
- Hjortstam, K. et al. (1987), *Corticaceae of North Europe* **1**, Introduction and Keys, *Fungiflora*, Blindern (60 S.) (= CNE **1**)
- Horak, E. (1968), *Synopsis generum Agaricalium* (Die Gattungstypen der Agaricales), *Beitr. Kryptogamenfl. Schweiz* **13**, Wabern-Bern (741 S.)
- Index Fungorum (Hrsg.: CABI Bioscience, CBS u. Landcare Research):
URL <http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp>
- Index Nominum Genericorum (ING) [Hrsg.: International Association for Plant Taxonomy (IAPT) u. Smithsonian Institution]:
URL: <http://ravenel.si.edu/botany/ing>
- Kirk, P.M., P.F. Cannon, J.C. David u. J.A. Stalpers (2001), *Dictionary of the Fungi*, 9th edition, CABI Bioscience, Wallingford, Oxon (655 S.)
- Kirk, P.M., P.F. Cannon, D.W. Minter u. J.A. Stalpers (2008), *Dictionary of the Fungi*, 10th edition, CABI, Wallingford, Oxon (771 S.)
- Kühner, R. u. H. Romagnesi (1977), *Compléments à la Flore Analytique*, *Bibl. Mycol.* **56**, Cramer, Vaduz (484 S.)
- Legon, N.W. u. A. Henrici (2005), *Checklist of the British and Irish Basidiomycota*, *Roy. Bot. Gard. Kew* (517 S.);
Nachträge 2006 u. 2007 im Internet:
<http://www.basidiochecklist.info/LatestUpdates.asp>
- Ludwig, E. (2000/2001), *Pilzkompendium*, Bd. **1** in zwei Teilbänden, "Abbildungen" u. "Beschreibungen", IHW, Eching (192 S./ 758 S.)

- McNeill, J. et al. (2006), International Code of Botanical Nomenclature (Vienna-Code), Gantner-Verlag (für die IAPT), Ruggell, Liechtenstein (568 S.)
- Moser, M., W. Jülich, C. Furrer-Ziogas, F. Bellu, A. Hausknecht u. Peintner (1985 ff.), Farbatlas der Basidiomyceten, Lieferung 1 ff., G. Fischer Stuttgart/ Spektrum Heidelberg & Berlin
- Mycobank (<http://www.mycobank.org>): Enthält alle Namen, Synonyme u. Basionyme der Pilze (incl. der Namen der Familien, Ordnungen und Klassen), sowie zu einem Teil der Arten Beschreibungen u. Abbildungen
- Oberwinkler, F. (2001), Basidiolichens, in K. Esser u. P.A. Lemke (Hrsg.), *The Mycota* **9**, 211
- Oertel, B. (2003), Bibliografische Recherchen in der Mykologie - ein Leitfaden für Leser im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, *Z. Mykologie* **69**, 3-42 (hier auf dieser CD befindet sich eine aktualisierte Fassung dieser Publikation)
- Reid, D.A. (1955), *TBMS* **38**, 387-399; Reid, D.A. (1958), *ibid.* **41**, 419-445; Reid, D.A. (1961), *Kew Bull.* **15**, 261-275; Reid, D.A. (1963/64), *ibid.* **17**, 267-308; Reid, D.A. ("1963", p. 1964), *Notes on some fungi ...*, *Persoonia* **3**, 97-154
- Reid, D.A. (1965), *A monograph of the stipitate steroid fungi*, *Beih. Nova Hedwigia* **18** (384 S.)
- Wojewoda, W. (2003), *Checklist of Polish larger Basidiomycetes, Biodiversity of Poland* **7**, Szafer Institute of Botany, Polish Acad. Sci., Krakau (812 S.)